AcidDuo
Purutabletit
LÄÄKINNÄLLINEN LAITE CE0426

VÄHENTÄÄ MAHANSISÄLLÖN TAKAISINVIRTAUSTA
LIEVITTÄÄ LIIKAHAPPOISUUTTA
SUOJAA MAHALAUKUN LIMAKALVOA

1. Valmiste, koostumus, ja käyttötarkoitus

Acidduo on tarkoitettu mahansisällön takaisinvirtauksen, hapon aiheuttaman polttelun ja näihin liittyvän raskaan olon lievittämiseen.
Acidduo lievittää mahan liikahappoisuutta ehkäisten närästystä, vatsakipua ja happamuuteen liittyviä ruoansulatusvaivoja.
Acidduo on tehokas valmiste riippumatta siitä, mistä vaivat johtuvat. Tätä valmistetta voi myös käyttää gastriitin (mahalaukun limakalvon tulehduksen, ns. mahakatarrin) tukihoitona.

1.1 Vaikutustapa

Acidduo sisältää seoksen useita eri ainesosia, jotka toimivat yhdessä mahalaukun happamassa ympäristössä.
Alginaatti on polysakkaridi (kuitu), jota eristetään tietyntyyppisistä merilevistä.
Kun tämä kuitu pääsee mahalaukun happamaan ympäristöön, se muodostaa nopeasti viskoosin ja kevyen geelin, joka peittää ja suojaa mahalaukun limakalvoa.
Valmisteen erityinen koostumus, joka sisältää sekä natriumalginaattia, algiinihappoa että bikarbonaattia, nopeuttaa edellä mainittua reaktiota entisestään.
Viskoosi (eli sakea, sitkeä) alginaattigeeli hillitsee mahalaukun mahansisältöä takaisin ruokatorveen työntäviä liikkeitä ja vähentää siten takaisinvirtausten määrää. Karbonaatin ja bikarbonaatin yhdistelmä neutraloi mahahappoa. Reaktiossa muodostuvat hiilidioksidikuplat jäävät alginaattigeelin sisälle, jolloin geeli muuttuu mahansisällön päälle kellumaan nousevaksi vaahdoksi.

1.2 Koostumus

Jokainen tabletti sisältää: 200 mg natriumalginaattia, 50 mg algiinihappoa, 80 mg natriumbikarbonaattia ja 140 mg kalsiumkarbonaattia.

Apuaineet

Mannitoli, sukraloosi, piidioksidi, kasviperäinen magnesiumstearaatti, glyseryylidibehenaatti, makuaineet: inkivääriuute, eteerinen inkivääriöljy, sitruuna, minttu.

2. Pakkaus

Yksi pakkaus sisältää 24 tai 36 tablettia.

3. Annostus ja antotapa

Ennen valmisteen mahdollista antoa lapselle, suositellaan keskustelua lääkärin kanssa. Varoitukset ja varotoimet, ks. tämän käyttöohjeen kohta 7.
Aikuiset (12-vuotiaista alkaen): Suositusannos on 2 purutablettia jokaisen pääaterian jälkeen.
Lapset (6–12-vuotiaat): Suositusannos on 1 purutabletti jokaisen pääaterian jälkeen.
Edellä mainitut annokset lievittävät tehokkaasti liikahappoisuutta ja estävät mahansisällön takaisinvirtausta ruokatorveen.
Suositeltua annosta ei saa ylittää.

4. Haittavaikutukset

Acidduo-valmisteen sisältämät ainesosat on spesifisesti testattu ja osoitettu turvallisiksi, täysin bioyhteensopiviksi ja hyvin siedetyiksi.
Ohjeen mukaisella annostuksella ainoat raportoidut, mahdollisesti ilmenevät haittavaikutukset ovat ummetus ja ohimenevä ripuli.
Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.

5. Yhteisvaikutukset ravintolisien ja lääkkeiden kanssa

Acidduo-valmisteen sisältämillä aineilla ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia ravintolisien kanssa. Yleissääntönä voidaan kuitenkin todeta, että kaikki ravintolisät (kuten vitamiinit, ravintoainevalmisteet, yrtti- tai homeopaattiset valmisteet) olisi otettava viimeistään kaksi tuntia ennen, tai aikaisintaan kaksi tuntia jälkeen, **Acidduo**-annoksen.

5.1 Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Viskoosin luonteensa vuoksi tämä lääkinnällinen laite saattaa viivästyttää tai vähentää samanaikaisesti otettujen lääkkeiden imeytymistä. Ole siis yhteydessä lääkäriin ennen **Acidduo**-tapaisen valmisteen käytön aloittamista, jos käytät lääkkeitä ja etenkin, jos käytät ehkäisypillereitä.
Tähän valmisteeseen ei liity tunnettuja vasta-aiheita samanaikaiselle omepratsoli-, simetidiini- tai sisapridilääkitykselle. Näissä tapauksissa suositellaan kuitenkin keskustelemaan käytöstä lääkärin kanssa.

6. Säilytys

Säilytä **Acidduo** kuivassa paikassa, suojassa suorilta lämmönlähteiltä ja valolta.
Älä käytä tätä valmistetta, jos pakkaus on vaurioitunut.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä valmiste alle 25°C:ssa.

7. Varoitukset ja varotoimet

Tämä valmiste on pääosin tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, ja ennen valmisteen käyttöä on suositeltavaa keskustella hoidosta apteekkihenkilökunnan tai lääkärin kanssa.
Valmistetta voi myös tilapäisesti antaa lapsille ja teini-ikäisille huomioiden, että annoksen 6–12-vuotiaille lapsille pitää olla puolet aikuisten annoksesta ja että käytön tulee tapahtua terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaan.
Raskauden ja imetyksen aikana suositellaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen mahdollista käyttöä. Suositeltua annostusta ei saa ylittää, sillä liian isot annokset voivat aiheuttaa ummetusta tai ohimenevää ripulia.
Valmistetta ei saa käyttää kroonisen ummetuksen tai ripulin, munuaissairauden tai kroonisen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä.
Älä käytä **Acidduo**-valmistetta yli 30 peräkkäisen päivän ajan. Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Tabletti on käytettävä kerralla ja se on otettava pakkauksestaan vasta käyttöhetkellä.
Älä käytä tätä valmistetta, jos huomaat siedettävyysongelmia.
Älä ota valmistetta, jos tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteen sisältämälle ainesosalle.

8. Kestoaika

Älä käytä tätä valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee ehjässä pakkauksessa säilytettyä tuotetta.

9. Hävittäminen

Vanhentunut valmiste on hävitettävä paikallisten jätesäännösten mukaisesti. Älä missään tapauksessa heitä valmistetta tai sen pakkausta luontoon.

Tarkistettu viimeksi: 05/2024

AcidDuo
Tuggtabletter
MEDICINTEKNISK PRODUKT, CE0426

DÄMPAR HALSBRÄNNA OCH SURA UPPSTÖTNINGAR
LINDRAR VID FÖR MYCKET MAGSYRA
SKYDDAR MAGSLEMHINNAN

1. Produkt, sammansättning och användningsändamål

Acidduo används för att motverka sura uppstötningar och halsbränna.
Acidduo gör det möjligt att kontrollera för mycket syra i magsäcken, förhindra halsbränna, magont och matsmältningsbesvär.
Acidduo är effektivt oberoende av vad besvären beror på och kan också användas som stödbehandling vid gastrit (en inflammation i magsäckens slemhinna, s.k. magkatarr).

1.1 Verkningsmekanism

Acidduo innehåller en blandning av flera ingredienser som verkar tillsammans i magsäckens sura miljö.
Alginat är en polysackarid (fiber) som utvinns ur vissa typer av havsalger.
När denna fiber kommer i kontakt med magsäckens sura miljö, bildar den snabbt en viskös och lätt gel, som täcker och skyddar magslemhinnan.
Denna speciella sammansättning innehållande natriumalginat, alginsyra och bikarbonat påskyndar ovannämnda reaktion.
Den viskösa alginatgelen gör det svårare för magsaften att röra sig uppåt, vilket därmed minskar antalet episoder med halsbränna och sura uppstötningar. Kombinationen av karbonat och bikarbonat neutraliserar magsyran.
De koldioxidbubblor som bildas i samband med reaktionen fångas inne i alginatgelen, vilket omvandlar gelen till ett skum som sedan flyter upp ovanpå maginnehållet.

1.2 Sammansättning

Varje tablett innehåller 200 mg natriumalginat, 50 mg alginsyra, 80 mg natriumbikarbonat och 140 mg kalciumkarbonat.

Hjälpämnen

Mannitol, sukralos, kiseldioxid, växtbaserat magnesiumstearat, glyceryldibehenat, smakämnen: extrakt av ingefära, eterisk ingefärsolja, citron, mint.

2. Förpackning

En förpackning innehåller 24 eller 36 tabletter.

3. Dosering och administreringssätt

Innan användning till barn rekommenderas att tala med läkare. För varningar och försiktighetsåtgärder, se avsnitt 7 i denna bruksanvisning.
Vuxna (från 12 år): rekommenderad dos är 2 tuggtabletter efter varje huvudmåltid.
Barn (6–12 år): rekommenderad dos är 1 tuggtablett efter varje huvudmåltid.
Ovan nämnda doser ger en effektiv lindring av besvär orsakade av för mycket magsyra, och de förhindrar också reflux av maginnehåll till matstrupen.
De rekommenderade doserna får inte överskridas.

4. Biverkningar

Ingredienserna i **Acidduo** har i specifika tester visats vara säkra, helt biokompatibla och vältolererade.
Vid rekommenderade doser är de enda rapporterade, möjligen förekommande biverkningarna förstoppning och övergående diarré.
Kontakta läkare om symtomen fortsätter.

5. Interaktioner med kosttillskott och läkemedel

Ingredienserna i **Acidduo** har inga kända interaktioner (samverkningar) med kosttillskott. Som regel kan man dock konstatera att alla kosttillskott (såsom vitaminer, näringspreparat, örtpreparat eller homeopatiska produkter) ska tas senast två timmar före, eller tidigast två timmar efter, **Acidduo.**

5.1 Interaktioner med läkemedel

På grund av sin viskösa natur kan denna medicintekniska produkt fördröja eller minska upptaget av läkemedel som tas samtidigt. Därför ska du kontakta läkare innan du börjar använda produkter som **Acidduo**, speciellt om du tar preventivmedel.
Detta preparat är inte förknippat med några kända kontraindikationer mot samtidig behandling med omeprazol, cimetidin eller cisaprid. I dessa fall rekommenderas dock konsultation med läkare.

6. Förvaring

Förvara **Acidduo** på en torr plats, i skydd mot direkt värme och ljus.
Använd inte detta preparat om förpackningen är skadad.
Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.

7. Varningar och försiktighetsåtgärder

Detta preparat är främst avsett för vuxna från 18 år. Det rekommenderas att tala med apotekspersonal eller läkare innan användning.
Preparatet kan ibland ges till barn och tonåringar, men då ska man observera att 6–12-åringar ska endast få hälften av den dos som rekommenderas till vuxna och att behandlingen ska utföras enligt instruktioner av hälsovårdspersonal.
Vid graviditet och amning rekommenderas konsultation med läkare före användning.
Rekommenderad dos får ej överskridas, eftersom alltför stora doser kan orsaka förstoppning eller övergående diarré.
Detta preparat får inte användas vid kronisk förstoppning eller diarré, njursjukdom eller kronisk hjärtsvikt.
Använd inte **Acidduo** i mer än 30 dagar i sträck. Kontakta läkare om symtomen fortsätter. Tabletterna är så kallade engångstabletter, och varje tablett ska tas ur sin förpackning först då det är dags att ta den.
Använd inte detta preparat om du observerar toleransproblem. Ta inte preparatet om du vet att du är överkänslig mot någon av ingredienserna.

8. Hållbarhet

Använd inte detta preparat efter det ”används före”-datum som anges på förpackningen.
Datumet avser preparat som förvarats i intakt förpackning.

9. Destruktion

När ”används före”-datumet passerats ska överblivet preparat förstöras enligt lokala regler för avfallshantering. Släng aldrig preparat eller förpackningar i naturen.

Reviderad senast: 05/2024

FI
SIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIA

Orion Oyj
PL 65
02101 Espoo
Suomi
Puh.: 010-4261

SE
SIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIEN

Orion Oyj
PB 65
02101 Esbo
Finland
Tfn.: 010-4261

CE 0426		Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Ks. käyttöohje.	Får inte användas om förpackningen är skadad, läs bruksanvisningen.	Viimeinen käyttöpäivämäärä.	Används senast den.
Lue käyttöohjeet.	Läs bruksanvisningen.	Säilytettävä valolta ja lämmöltä suojassa.	Skyddas från ljus och värme.	LOT Eränumero.	Satsnummer.
MD Lääkinnällinen laite.	Medicinteknisk produkt.	Säilytettävä kuivassa.	Förvaras torrt.	Jakelija.	Distributör.
25°C Säilytyslämpötilan yläraja.	Övre temperaturgräns för förvaring.	Kertakäyttöinen.	Endast för engångsbruk.	Käännös.	Översättning.
		Varoitus.	Försiktighet.	Valmistaja.	Tillverkare.
				Hävitä asianmukaisesti käytön jälkeen.	Släng på sakenlig sätt efter användning.

S-0014803-1

ORION PHARMA

03011922/1