

**POSIVIL FLUZINK, VERIAPPELSIINI**  
**POSIVIL FLUZINK, SITRUUNA-LAKRITSI**  
**POSIVIL FLUZINK, MUSTAHERUKKA**  
**POSIVIL FLUZINK, VADELMA-SALMIAKKI**



Imeskelytabletti flunssan oireiden helpottamiseen ja keston lyhentämiseen

**KÄYTTÖTARKOITUS:** Veriappelsiinin, sitruuna-lakritsin, mustaherukan tai vadelma-salmiakkin makuinen sinkkiasetaatti-imeskelytabletti. Posivil Fluzink lyhentää virusperäisen flunssan kestoja ja lievittää sen oireita. Tuote estää virusten kiinnittymistä suun ja nielun limakalvoille, vähentää taudinaiheuttajien määrää ja laskee turvotusta.

**KOOSTUMUS:** Sinkkiasetaatti (10 mg sinkkiä), sorbitoli, ksylitoli, sukraloosi, piidioksidi, magnesium-stearaatti. Lisäksi aromiaineet: Posivil Fluzink Veriappelsiini: veriappelsiini-aromi, Posivil Fluzink Sitruuna-Lakritsi: sitruuna-, lakritsi- ja vanilja-aromi, Posivil Fluzink Mustaherukka: mustaherukka- ja vanilja-aromi ja Posivil Fluzink Vadelma-Salmiakki: salmiakki-, lakritsi- ja vadelma-aromi.

**KÄYTTÖOHJE:** Tuotteen käyttö aloitetaan flunssan ensioireiden ilmaannuttua. Yksi tabletti imeskellään 1,5–2 tunnin välein. Anna tabletin liueta hitaasti suussa. Älä huuhto suuta vedellä heti tabletin oton jälkeen.

Suosittelun vuorokausiannos, 8–10 tablettia, sisältää 80–100 mg sinkkiä. Älä ylitä annostusta.

Käytä päivittäin kunnes oireet poistuvat, suositellaan korkeintaan viikon pituisia yhtäjaksoista käyttöä.

Ei alle 12-vuotiaille.

**HAITTAVAIKUTUKSET:** Saattaa aiheuttaa lyhytaikaista metallista jälkimakua tai laksatiivisia vaikutuksia. Tuotteen ohjeen mukaisella käytöllä ei ole odotettavissa muita haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia lääkevalmisteiden kanssa. Mikäli olet ylittänyt suositellun annostuksen ja sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin.

**SÄILYTYS:** Säilytetään huoneenlämmössä.

**VAROITUKSET:**

- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Jos tuote aiheuttaa allergioireita, tulee sen käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin.
- Tuotetta ei tule käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Käytä tuotetta varoen, jos sairastat Sjögrenin syndroomaa, systeemistä skleroosia tai jos olet iäkäs ja sinulla on kuiva suu, koska tuotteen käyttö voi ärsyttää suun limakalvoja.
- Ota yhteys lääkäriin, mikäli oireet pahenevat tai kestävät yli viikon.
- Jos muita haittavaikutuksia ilmenee, keskeytä tuotteen käyttö ja/tai ota yhteys lääkäriin.
- Voit haluta lukea tämän pakkausselosteen uudelleen, joten säilytät se kunnes olet lopettanut tuotteen käytön.
- Jos tämä lääkinällinen laite aiheuttaa vakavan vaaratilanteen, ilmoita valmistajalle ja ota yhteys paikalliseen terveydenhuoltoon, joka ilmoittaa viranomaisille.

**JAKELIJA:** Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo

**VALMISTAJA:** Pharmia Oy, Kalliotie 2, 04360 Tuusula

**PAKKAUSMERKINTÖJEN KUVAUS**



Säilytys-  
lämpötila



Suojaa  
auringonvalolta



Eränumero



Viimeinen käyttö-  
päivämäärä



Lue  
pakkausseloste  
ennen käyttöä



Lue varoitukset  
pakkausselosteesta



Valmistaja



Lääkinällinen  
laite

**POSIVIL FLUZINK, BLODAPELSIN**  
**POSIVIL FLUZINK, CITRON-LAKRITS**  
**POSIVIL FLUZINK, SVART VINBÄR**  
**POSIVIL FLUZINK, HALLON-SALTLAKRITS**

Sugtablett som lindrar förkylningssymtomen och förkortar förkylningens längd

**ANVÄNDNING:** Sugtablett med zinkacetat och smak av blodapelsin, citron-lakrits, svart vinbär eller hallon-saltlakrits. Posivil Fluzink förkortar sjukdomsförloppet och lindrar symtomen vid förkylningar orsakade av virus. Produkten hindrar virusen från att fästa sig vid slemhinnorna i mun och svalg, minskar antalet sjukdomsalstrande patogener och minskar svullnaden.

**INNEHÅLL:** Zinkacetat (10 mg zink), sorbitol, xylitol, sukralos, kiseldioxid, magnesiumstearat. Dessutom följande smakämnen: Posivil Fluzink Blodapelsin: blodapelsin-arom, Posivil Fluzink Citron-Lakrits: citron-, lakrits- och vaniljarom, Posivil FluZink Svart vinbär: svart vinbär- och vaniljarom och Posivil Fluzink Hallon-Saltlakrits: saltlakrits-, lakrits- och hallon arom.

**BRUKSANVISNING:** Börja använda produkten vid de första symtomen på en annalkande förkylning. Ta 1 sugtablett med 1,5–2 timmars mellanrum. Låt tablettens smälta långsamt i munnen. Skölj inte munnen med vatten omedelbart efter att du har tagit tablettens.

Den rekommenderade dagliga dosen på 8–10 tabletter innehåller 80–100 mg zink. Överskrid inte doseringen. Använd sugtablettarna dagligen tills symtomen gått över. Rekommenderad längsta användningstid: 1 vecka i sträck. Ej för barn under 12 år.

**BIVERKNINGAR:** Kan orsaka en kortvarig metallisk eftersmak i munnen eller ha laxativ effekt. Vid användningen enligt instruktionerna har produkten inga andra förväntade biverkningar eller interaktioner med läkemedel. Ifall du har överskridit den rekommenderade dosen och upplever biverkningar, kontakta läkare.

**FÖRVARING:** Förvaras i rumstemperatur.

**VARNINGAR:**

- Använd inte produkten om du är allergisk mot något innehållsämne. Om produkten orsakar allergiska symtom, sluta använda den och kontakta läkare.
- Produkten bör inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd produkten försiktigt om du lider av Sjögrens syndrom, systemisk skleros eller om du är åldrad och har en torr mun eftersom användningen av produkten kan irritera slemhinnorna i munnen.
- Kontakta läkare om symtomen blir värre eller varar i mer än en vecka.
- Om biverkningar skulle uppstå, sluta använda produkten och/eller kontakta läkare.
- Du kanske behöver läsa denna bipacksedel på nytt, så förvara den tills du slutat använda preparatet.
- Om denna medicinteknisk produkt orsakar en allvarlig fara, vänligen meddela tillverkaren och kontakta din lokala vårdgivare som kommer att meddela myndigheterna.

**DISTRIBUTÖR:** Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo

**TILLVERKARE:** Pharmia Oy, Kalliotie 2, 04360 Tusby

**FÖRKLARINGAR TILL SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN**

